

VARSTVO PORA IN KAPUSNIC

Porova škrlatna pegavost

Na poru se trenutno intenzivneje pojavlja porova škrlatna pegavost. Bolezenska znamenja na listih se najprej kažejo kot blede zelene pege. V vlažnih razmerah se pege vijolično obarvajo in imajo rumeno rjavo obrobo. Pege se lahko združujejo in povzročijo rumenenje in venenje listov, ob hujši okužbi pa tudi odmiranje listov.



Slika 1: Porova škrlatna pegavost na listih pora

Varstvo

Med varstvenimi ukrepi so pomembni dovolj širok kolobar (vsaj 4 leten-velja za čebulnice), skrb za odcedna tla in zračnost posevka oz. nasada. Za varstvo pred porovo škrlatno pegavostjo lahko v poru uporabite enega od naslednjih fungicidov: Ortiva 1 l/ha (registracija za male uporabe), Mirador 250 SC 1 l/ha, Zaftra AZT 250 SC 1 l/ha

Kapusnice

Pridelovalce zelja ponovno opozarjam na močnejši pojav škodljivih gosenic listnih sovk in belinov. Gosenice listnih sovk je potrebno zatirati preden se zavrtajo v glave. Kritično število je v povprečju ena gosenica na rastlino. Za varstvo pred gosenicami listnih sovk lahko v zelju uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: Affirm , Agree WG , Bulldock EC 25, Delfin WG, Decis 100 EC, Fastac 100 EC, Karate zeon 5 CS, Karis 10 SC, Lepinox Plus, Mimic, Neemazal T/S ali Steward. Enake pripravke lahko uporabite za varstvo zelja pred gosenicami belinov.



Slika 2: Poškodbe (izjede), ki so jih povzročile škodljive gosenice

Prpravila: Breda Vičar