

VARSTVENI UKREPI V ČEBULNICAH PRED POROVO ZAVRTALKO IN RESARJI

Porova zavrtalka je najpogostejša škodljivka čebulnic. Ima dva rodova letno. V SV delu Slovenije v zadnjih nekaj letih opažamo prve poškodbe samic (prvega rodu) na listih od srede marca do prve deкаде aprila. Muha meri 4-5 mm, je črna siva z rumenimi boki na zadku. Prisotnost porove zavrtalke spoznamo po nizu zaporednih vbodov, ki jih naredijo samice z dopolnilnim hranjenjem (slika 1). Škodo povzročajo ličinke. Te rižejo podolgovate ravne ali zavite rove v listih in čebulici, oz. lažnem stebelu. Poškodovani listi se zvijejo, nato porumenijo, močno poškodovani listi pa na koncu odmrejo. Napadene rastline se slabše razvijejo, čebule so zato manjše.



Slika 1: Poškodbe, ki jih naredi samica porove zavrtalke pri dopolnilnem hranjenju

Nalet muh lahko spremljate z rumenimi lepljivimi ploščami. Za varstvo čebulnic pred porovo zavrtalko je najbolj učinkovit ukrep prekrivanje posevkov oz. nasadov. Zaščitne prekrivke je treba uporabiti prej ali vsaj na začetku naleta in odkriti po končanem letu muh. Opazovalno napovedovalna služba opozarja, da so odkrili na območju SV Slovenije na poru in česnu prve poškodbe po porovi zavrtalki. Na posevkih česna in šalotke je za varstvo pred porovo zavrtalko dovoljena uporaba pripravka Perfekthion v odmerku 0,6 l na ha (registracija za manjše uporabe).

Opazovalno napovedovalna služba obvešča, da so na območju SV Slovenije v nasadih pora že najdene tudi poškodbe po resarjih. Za spremljanje populacije resarjev so primerne modre lepljive plošče.

Za zmanjšanje populacije resarjev v poru in čebuli lahko uporabite pripravek Laser 240 SC v odmerku 0,45 l/ha ali Laser plus (na prostem) v odmerku 0,2 l/ha. Laser je potrebno uporabiti ob izleganju prvih ličink. V čebuli, česnu in šalotki je za varstvo pred resarji registriran pripravek Perfekhion v odmerku 0,6 l/ha.

Pripravila: Breda Vičar