

VARSTVO PORA PRED POROVO ŠKRLATNO PEGAVOSTJO

Porova škrlatna pegavost (*Alternaria porri*)

Na poru se trenutno ponekod pojavlja porova škrlatna pegavost. Glivi *Alternaria porri* ugaja vroče in vlažno vreme. Za razvoj spor glive je potrebna 15 urna namočenost listov. Bolezenska znamenja na listih se najprej kažejo kot blede zelene pege. V vlažnih razmerah se pege vijolično obarvajo in imajo rumeno rjavo obrobo. Pogoste padavine in/ali močne rose so ugodne za pojav in širjenje glive. Spore lahko prenašajo tudi zračni tokovi. Starejši listi in starejše rastline so bolj občutljive za okužbe z omenjeno glivo. Pege se lahko združujejo in povzročijo rumenenje in venenje listov, ob hujši okužbi pa tudi odmiranje listov.



Slika 1: Porova škrlatna pegavost na listih pora

Varstvo

Med varstvenimi ukrepi so pomembni dovolj širok kolobar (vsaj 4 leten-velja za čebulnice), skrb za zdravo seme in sadike, odcedna tla in zračnost posevka oz. nasada. Za varstvo pred porovo škrlatno pegavostjo lahko v poru uporabite enega od naslednjih fungicidov: Luna experience – 1 l/ha, Mirador 250 SC 1 l/ha, Ortiva - 1 l/ha, Sercadis plus- 1 l/ha, Signum -1,5 kg/ha, Zaftra AZT 250 SC 1 l/ha ali Zoxis 250 SC – 1 l/ha.

Pripravila: Breda Vičar