

VARASTVO SOLATNIC PRED GOSENICAMI SOVK

SOVKE V SOLATI IN ENDIVIJI

Gosenice sovk (predvsem južne plodovrtke) povzročajo škodo v solati in endiviji. Trenutno so gosenice južne plodovrtke, ki smo jih odkrili pri pregledih solatnic, še v zgodnejših razvojnih stadijih (3-12 mm). Mlajši razvojni stadiji gosenic so neprimerno bolj občutljivi za insekticide kot starejši.

Za varstvo pred gosenicami južne plodovrtke v solati lahko uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: Affirm -1,5 kg/ha (karenca je 3 dni), Agree WG- 1 kg/ha (karenca ni potrebna), Laser 240 SC-0,3 l/ha (karenca je 14 dni) ali Laser plus-0,25 l/ha (karenca je 3 dni), Lepinox Plus-1 kg/ha (karenca ni potrebna) ali Steward-125 g/ha (karenca je 3 dni).

V endiviji sta za varstvo pred južno plodovrtno registrirana pripravke: Agree WG-1 kg/ha (karenca ni potrebna), Laser plus-0,25 l/ha (karenca je 3 dni), Lepinox Plus- 1 kg/ha (karenca ni potrebna) in Steward-125 g/ha (karenca je 3 dni).



Fotografiji sovk najdenih na solati 3. oktobra 2019

Pripravila: Breda Vičar