

OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEBULNIC!

V čebulnicah opazamo prve poškodbe po porovi zavrtalki. Prva znamenja napada so vidna na listih, kot zaporedno nanizane majhne svetle pegice, ki nastanejo zaradi vbodov samice porove zavrtalke po dopolnilnem hranjenju (slika 1). Omenjena škoda ni gospodarsko pomembna, je pa zanesljivo znamenje za nalet in prisotnost muh v posevku ali nasadu čebulnic.



Slika 1: Poškodbe na listu česna po dopolnilnem hranjenju

Odrasla porova zavrtalka je majhna muha. S krili vred meri v dolžino 4-5 mm. Iz jajčec, ki jih samica odloži v listno tkivo se po nekaj dneh izležejo ličinke-žerke. Žerke povzročajo hujše poškodbe, saj rijejo rove v listih in po notranji strani listnih nožnic v smeri proti dnu čebulice. Napadeni listi se zvijajo, rumenijo od konic navzdol in lahko propadejo. Let porove zavrtalke traja približno mesec dni, v hladnejših letih in na hladnejših območjih pa lahko traja tudi dlje.

Posledice napada zmanjšamo ali ublažimo z odstranjevanjem in uničevanjem poškodovanih rastlin in rastlinskih ostankov ter s prekrivanjem posevkov s protiinsektivnimi mrežami ali agrokopreno in tako odraslim osebkom preprečimo dostop do rastlin in odlaganje jajčec na rastline. Zaščitne prekrivke uporabimo pred ali vsaj na začetku leta muhe in posevke odkrijemo šele po končanem letu muhe.

Za varstvo pred porovo zavrtalko lahko v česnu in šalotki uporabite pripravke Perfethion. V čebuli, šalotki in česnu je za varstvo pred grizočimi žuželkami registriran pripravek Karate zeon 5 CS, ki ga v omenjenih čebulnicah lahko

uporabimo za varstvo pred porovo zavrtalko. Za boljšo učinkovitost zatiranja je priporočljivo škropilni brozgi dodati močilo.

Pripravila: Breda Vičar