



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MURSKA SOBOTA

Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Tel. 02 539 14 10, fax. 02 521 14 91
E-mail: tajnistvo@kgzs-ms.si
Internet: www.kgzs-ms.si

Datum: 10. 4. 2020

Nasvet 6: insekticidi v krompirju

INSEKTICIDI V KROMPIRJU, REGISTRIRANI V REPUBLIKI SLOVENIJI (na dan 10. 4. 2020)

PRIPRAVEK	ŠKODLJIVEC	ODMEREK /HA	ČAS UPORABE	KARENCA ŠT.DNI	ATIVNA SNOV
ALVERDE	Koloradski hrošč	0,25 L	Ko je presežen prag škodljivosti in sicer v času od fenološke faze petega lista do začetka dozorevanja gomoljev	14	<i>Metaflumizon</i>
BISCAYA	Koloradski hrošč, listne uši	0,3 L	Ko je presežen prag škodljivosti	14	<i>Tiaklopid</i>
BULLDOCK EC 25	Koloradski hrošč	0,5 L	Ko je presežen prag škodljivosti	7	<i>Beta-ciflutrin</i>

CALYPSO SC 480	Koloradski hrošč	0,1 L	Ko je presežen prag škodljivosti ali v deljeni aplikaciji 0,05 l prvič in po ponovnem napadu škodljivca 0,05 l drugič	21	<i>Tiaklopid</i>
CLOSER	Listne uši	0,2 L	Ob pojavu uši, ko je presežen prag škodljivosti, od fenološke faze tvorbe bazalnih stranskih poganjkov do fenološke faze staranja, ko je 50 % listov rjavkastih Uporaba v eni rastni sezoni največ dva krat v časovnem razmaku 21 dni	7	<i>Sulfoksaflor</i>
CORAGEN	Koloradski hrošč	0,06 L	V času odlaganja jajčec Uporaba dva krat v edni rastni sezoni v časovnem razmaku 21 dni	14	<i>Klorantraniliprol</i>
DASKOR 440	Koloradski hrošč Listne uši UPORABA DO 16. 4. 2020	0,75 L 0,625 L	Ob pojavu škodljivih žuželk	21	<i>Cipermetrin + klorpirifosmetil</i>

EVURE	Koloradski hrošč	0,2 L	Za zatiranje ličink in zmanjševanje številčnosti populacije odraslih hroščkov	14	<i>Tau-fluvalinat</i>
FORCE 1,5 G	Strune, drugi talni škodljivci	5 KG	Ob saditvi krompirja z obvezno sadilno opremo inkorporacija na globino 5 – 8 cm Brez primerne opreme za inkorporacijo uporaba ni dovoljena Ne sme se uporabljati na zgodnjem krompirju	Čas uporabe	<i>Teflutrin</i>
KAISO EG	Listne uši UPORABA DO 15. 12. 2020	150 G	Ko je presežen prag škodljivosti	7	<i>Lambda-cihalotrin</i>
KARATE ZEON 5 SC	Listne uši	0,15 L	Ko je presežen prag škodljivosti	7	<i>Lambda-cihalotrin</i>
KARIS 10 CS	Listne uši	0,075 L	Ko je presežen prag škodljivosti, uporaba največ dva krat v eni rastni sezoni v časovnem razmiku 7 dni	7	<i>Lambda-cihalotrin</i>
LASER 240 SC	Koloradski hrošč	0,2 L	Prvič, ko se pojavijo prve izlegle ličinke	7	<i>Spinosad</i>

			oziroma takoj po izleganju jajčec, uporaba največ dva krat v eni rastni sezoni v časovne razmiku 10 dni		
LASER PLUS	Koloradski hrošč	0,04 L	Prvič, ko se pojavijo prve izlegle ličinke oziroma takoj po izleganju jajčec, uporaba največ dva krat v eni rastni sezoni v časovne razmiku 7 dni	14	<i>Spinosad</i>
MAVRIK 240	Koloradski hrošč	0,2 L	Za uničevanje ličink in zmanjšanje številčnosti odraslega hrošča	14	<i>Tau-fluvalinat</i>
MOSPILAN 20 SC	Koloradski hrošč Siva breskova uš	0,1 KG 0,2 KG	Ob pojavu škodljivih organizmov, uporaba največ enkrat v rastni sezoni	14	<i>Acetamiprid</i>
MOVENTO SC 100	Listne uši	0,75 L	Ob pojavu listnih uši, od fenološke faze končanega cvetenja dalje, uporaba širi krat v eni rastni sezoni v časovnem razmaku 7 dni	14	<i>Spirotet ramat</i>

NATURALIS	Delno zatiranje strun	3 L	Ob saditvi ali osipanju, ob sajenju pred zagrinjanjem se tretira tla in gomolje v odmerku 2 l/ha in 1 l/ha pred osipanjem	Ni potrebna	<i>Beauveria bassiana, sev ATCE 7404</i>
NEEMAZAL – T/S	Koloradski hrošč	2,5 L	Za zmanjšanje pojava mladih ličink, uporaba največ dva krat v eni rastni sezoni, ko je presežen prag škodljivosti	4	<i>Azadirachtin A</i>
OVITEX	Uši delno	15 L	Ob pojavu škodljivca, uporaba največ dva krat v eni rastni sezoni v časovnem razmaku 15 dni	Ni potrebna	<i>Parafinsko olje</i>
PIRIMOR 50 WG	Uši	0,5 KG	Ob pojavu škodljivca, uporaba največ dva krat v eni rastni sezoni v časovnem razmaku 7 – 14 dni	Zagotovljena z načinom uporabe	<i>pirimikarb</i>
RAPTOL KONCENTRAT	Koloradski hrošč	8 L	Ob pojavu škodljivca, uporaba največ dva krat v eni rastni sezoni v časovnem razmiku 7 dni	3	<i>Olje navadne ogrščice + piretrin</i>

SPARVIERO	Koloradski hrošč UPORABA DO 21. 1. 2021	0,075 L	Ob pojavu škodljivca, ko je presežen prag škodljivosti, uporaba največ enkrat v rastni sezoni	7	<i>Lambda-cihalotrin</i>
TEPPEKI	Listne uši	0,14 KG	Prvič ob pojavu uši, ko je presežen prag škodljivosti, uporaba največ dva krat v eni rastni sezoni v časovnem razmaku na 21 dni	14	<i>flonikamid</i>

Prag škodljivosti predstavlja število škodljivih organizmov na ustrezno enoto, ki lahko povzročijo gospodarsko škodo in jih je potrebno začeti zatirati (Vir: <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-1345/pravilnik-o-zahtevani-dokumentaciji-za-registracijo-in-oceno-fitofarmaceutskih-sredstev>). **Prag škodljivosti** je tista stopnja napada, ki lahko povzroči večjo škodo, kot znašajo stroški varstva (Kacsi, 1968). **Prag škodljivosti za koruznega hrošča pri krompirju je 10 ali več ličink/m² ali več kot 15% napadenih grmov.**

Vedno, ko se odločite, da boste posegli po fitofarmaceutskih pripravkih, preglejte nasade krompirja in se posvetujte s strokovnjakom.

In OBVEZNO pred uporabo preberite navodilo o uporabi in upoštevajte predpisana navodila.

Upoštevajte navodila fitofarmaceutskih sredstev, ki so označena kot NEVARNA ČEBELAM.

Vir: <http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm>

Pripravila: Metka Barbarič, KGZS-zavod MS