

Preglednica: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v Republiki Sloveniji za uporabo v žitih – herbicidi (na dan 2. 3. 2021):

pripravila Metka Barbarič, KGZS-zavod MS

PRIPRAVEK	ODMEREK /ha	DELOVANJE NA	ČAS UPORABE	Uporaba v
<b>ADENTIS</b>	<b>20 g</b>	Enoletni širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, spomladi, od razvojne faze, ko je prvo kolence 1 cm nad mestom razraščanja ter najpozneje do faze zastavičarja, ko je ploskev zgornjega lista zravnana in viden jeziček	NP, NJ
<b>ALISTER NEW</b>	<b>1 l</b>	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Jesen oz. konec zime ali zgodaj spomladi v razvojnem stadiju od dveh razvitih listov do konca razraščanja	NP
<b>ALLIANCE</b>	<b>0,065 – 0,1 kg</b>	Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od 3. lista do konca razraščanja	NP, OJ, OR, T, JJ
<b>ALLY SX</b>	<b>30 g</b>	Enoletni širokolistni pleveli	Od fenološke faze drugega (jarine), od začetka razraščanja (ozimine) do fenološke faze pojave zastavičarja	NP, NJ, NO, P, R, T
<b>ARNOLD</b>	<b>0,6 l</b>	Ozkolistni in širokolistni pleveli	Pred vznikom posevka ali po vzniku posevka, od fenološke faze, ko je razvit prvi list do faze, ko sta zaznavna dva stranska poganjka	NP
<b>ARRAT</b>	<b>0,2 kg</b>	Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od pojava treh listov do konca razraščanja	JP, JJ, NP, OJ
<b>ATLANTIS STAR</b>	<b>0,2 – 0,333 kg</b>	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, spomladi, ko ima žito razvito tri liste, do faze, ko je drugo kolence največ 2 cm nad prvim kolencem	NP, T
<b>AXIAL</b>	<b>0,6 – 1,2 l</b>	Enoletni ozkolistni plevel, gluhi oves, ljuljke, srakoperec, njivski lisičji rep	Po vzniku posevka, od faze treh listov do pojave zastavičarja	NP, OJ, JJ
<b>AXIAL ONE</b>	<b>1 l</b>	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Od faze treh listov do pojava zastavičarja	JP, JJ, NP, OJ
<b>BASAGRAN 480</b>	<b>2 l</b>	Širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od razraščanja do začetka kolenčenja	NJ, NO, NP, T, R, JJ
<b>BIATHLON 4D</b>	<b>70 g + močilo</b>	Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od 3. lista do pojava zastavičarja	NP, NJ, NO, P, R, T, trda pšenica
<b>BIZON</b>	<b>1 l</b>	Enoletni širokolistni pleveli, navadni srakoperec	Po vzniku posevka, od razvojne faze razvitega prvega lista do razvojne faze, ko so zaznavni trije stranski poganjki Rž – od razvojne faze razvitega prvega do razvitega četrtega lista	NP, NJ, P, R, T

Legenda: OP – oz. pšenica, OJ – oz. ječmen, JP – j. pšenica, JJ – j. ječmen, OR – oz. rž, NO – nav. oves, SŽ – strna žita, JŽ – j. žito, OŽ – oz. žito, T – tritikala, NP – nav. pšenica, NJ – nav. ječmen, P – pira, R – rž, OT – oz. tritikala, JT - jara tritikala

<b>BONACA</b>	<b>0,6 – 0,8 l</b>	Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od fenološke faze od dveh razvitih listov do stopnje zastavičarja	NP, NJ
<b>BOXER</b>	<b>2,5 – 5 l</b>	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	5 l po setvi, vendar pred vznikom; 2,5 – 5 l po vzniku posevka	OP, OJ
<b>BOUDHA</b>	<b>20 g</b>	Širokolistni pleveli <b>UPORABA DO 28. 10. 2020</b>	Po vzniku posevka, od fenološke faze začetka razraščanja ter najpozneje do faze, ko se začne pojavljati zastavičarja	OP, OJ, NO, R, T
<b>CLYDE FX</b>	<b>1,5 l</b>	Enoletni in večletni širokolistni pleveli	V ozimni pšenici in ozimnem ječmenu v odmerku 1,5 L/ha, spomladi, od razvojne faze, ko sta dva stranska poganjka zaznavna (BBCH 22), in najdlje do pozne faze nabrekanja, ko je listna nožnica vidno nabrekla (BBCH 45); V jari pšenici in jarem ječmenu v odmerku 1,5 L/ha, od razvojne faze, ko sta dva stranska poganjka zaznavna (BBCH 22), in najdlje do razvojne faze, ko je četrto kolence vsaj 2 cm nad 2. kolencem (BBCH34); V jarem ovsu odmerku 1,5 L/ha od razvojne faze, ko so trije stranski poganjki zaznavni (BBCH 23) in najdlje do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja (BBCH 31); V ozimni rži v odmerku 1,5 L/ha, spomladi, od razvojne faze, ko je šest stranskih poganjkov zaznavnih (BBCH26), in najdlje do stopnje zastavičarja: ploskev zgornjega lista zravnana, viden ježiček (ligula) (BBCH 39); V ozimni tritikali v odmerku 1,5 L/ha, spomladi, ko je sedem listov razvitih (BBCH 17) in najdlje do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem (BBCH 32); V ozimni trdi pšenici (durum) v odmerku 1,5 L/ha, spomladi, od konca razraščanja (BBCH 29) in najdlje do faze, ko je viden zgornji list (zastavičar), vendar je še zvit (BBCH37).	NP, NJ, O, R, T
<b>CORELLO DUO</b>	<b>170 – 265 g</b>	Ozkolistni in širokolistni pleveli + močilo Nu-Film-17 0,1 l/ha	Po vzniku posevka, spomladi, od razvojne faze začetka razraščanja do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja	NP, P, R, T
<b>CORIDA</b>	<b>20 g</b>	Enoletni širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, spomladi, od razvojne faze žita, ko je kolence vsaj 1 c, nad mestom razraščanja ter	NP, NJ

Legenda: OP – oz. pšenica, OJ – oz. ječmen, JP – j. pšenica, JJ – j. ječmen, OR – oz. rž, NO – nav. oves, SŽ – strna žita, JŽ – j. žito, OŽ – oz. žito, T – tritikala, NP – nav. pšenica, NJ – nav. ječmen, P – pira, R – rž, OT – oz. tritikala, JT – jara tritikala

			najpozneje do faze zastavičarja	
DUPLOSAN KV	<b>2 l</b>	Enoletni širokolistni pleveli, metlika, zvezdica, plešec, plezajoča lakota	Uporaba v času od začetka razraščanja do začetka kolenčenja	JP, JJ, NP, OJ
DUPLOSAN KV 600	<b>1,5 l</b>	Širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, v fazi razraščanja	NP, NJ, NO, R, T
EMCEE	<b>1 l</b>	Širokolistni pleveli	Jara žita – od fenološke faze treh razvitih listov do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem Ozimna žita – od fenološke faze od vidnega prvega kolanca do faze zastavičarja	NP, NJ, NO, R, T
ERGON	<b>70 g</b>	Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od pojava dveh listov do pojava zastavičarja	JP, JJ, NP
ESTERON	<b>0,75 – 1 l</b>	Širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od konca razraščanja do faze drugega kolanca	NJ, NP, T
FINY	<b>30 g</b>	Enoletni širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od začetka razraščanja, ko so vidni trije stranski poganjki, do fenološke faze zastavičarja (v spomladanskem času)	NP, OR, T
FLAME	<b>30 g</b>	Širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, spomladi, od razvojne faze žita, ko so razviti trije listi, do najpozneje do razvojne faze zastavičarja, ko je ploskev zgornjega lista zravnana in viden ježiček	NP, NJ
FLASH 500 SC	<b>0,28 l</b>	Enoletni širokolistni pleveli, jetičnik, križnice, navadna zvezdica, navadni srakoperec, nediseča trirobka, njivska vijolica, plezajoča lakota, škrlatnordeča mrtva kopriva	Uporaba pred vnikom posevka ali po vniku, od fenološke faze, ko je razvit prvi list, do fenološke faze, ko sta zasnovana dva stranska poganjka	NP, NJ
FLUENT 500 SC	<b>0,4 l</b>	Navadni srakoperec, njivski lisičji rep	Jesen, ko so žita v fenološki fazi od prvega do šestega lista	NP, NJ
FLUROSTAR 200	<b>1 l</b>	Enoletni širokolistni pleveli	Ozimna pšenica, ozimni ječmen, rž, tritikala – od razvojne faze dveh listov, do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja	NP, NJ, O, R, T
	<b>0,75 l</b>		Jara pšenica, jari ječmen – od razvojne faze dveh listov do pojava zastavičarja	
GRANSTAR SUPER 50 SX	<b>60 g</b>	Širokolistni pleveli <b>UPORABA DO 31. 7. 2021</b>	Po vzniku posevka, ko imajo žita razvitih 7 listov do faze, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad prvim	JJ, NP, NO, OJ, R, T
GRODYL	<b>20 – 40 g</b>	Širokolistni in ozkolistni pleveli	Od faze treh listov do drugega kolanca	NP, NJ, P, NO, R, T
HERBOCID XL	<b>1,25 l</b>	Širokolistni pleveli	Od sredine razraščanja do konca razraščanja	NJ, NP, R, T
HUSSAR OD	<b>0,1 l</b>	Ozkolistni in širokolistni pleveli	Od začetka razraščanja do začetka razvoja zgornjega	JJ, NP, OR, OT, OJ

Legenda: OP – oz. pšenica, OJ – oz. ječmen, JP – j. pšenica, JJ – j. ječmen, OR – oz. rž, NO – nav. oves, SŽ – strna žita, JŽ – j. žito, OŽ – oz. žito, T – tritikala, NP – nav. pšenica, NJ – nav. ječmen, P – pira, R – rž, OT – oz. tritikala, JT – jara tritikala

			lista	
<b>HUSSAR PLUS</b>	<b>0,21 0,15 l</b>	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Od faze treh listov do začetka kolenčenja	JJ, NP, R, T
<b>HUSSAR STAR</b>	<b>0,2 – 0,3 l + močilo 1l/ha</b>	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Spomladi, od razvojne faze začetka razraščanja žit, do faze kolenčenja, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem	NP, OR, T
<b>LANCELOT SUPER</b>	<b>33 g 25 g</b>	Širokolistni plevel	Ozimna žita – od faze začetka razraščanja do faze drugega kolanca  Jara – od faze, ko so razviti trije listi, do faze konca razraščanja	NP, NJ, R, T
<b>LECTOR DELTA</b>	<b>0,075 l 0,1 l</b>	Širokolistni plevel	Jesen po vzniku od razvojne faze dveh listov, do faze, ko sta dva stranska poganjka zaznavna  Spomladi po vzniku, od razvojne faze začetek razraščanja, ko je prvi stranski poganjek zaznaven, do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem	NP, NJ, R, T
<b>LONTREL 100</b>	<b>0,9 l</b>	Širokolistni pleveli, dresen, glavinec, kamilica, grašica, plešec, osat, slak, plezajoča lakota	Po vzniku posevka, od začetka razraščanja in do faze, ko je prvo kolence 1 cm nad mestom razraščanja	NP
<b>LONTREL 72SG</b>	<b>0,17 kg</b>	Širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od razvojne faze začetka razraščanja, ko je zaznaven prvi stranski poganjek, do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja	ŽITO
<b>MEZZO</b>	<b>20 – 30 g</b>	Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od faze dveh listov do pojava zastavičarja	JŽ, OŽ
<b>MUSTANG 306 SE</b>	<b>0,4 – 0,6 l/ha</b>	Širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od začetka razraščanja do faze drugega kolanca	JP, JJ, NP, OJ
<b>MUSTANG FORTE</b>	<b>1 l 0,8 l</b>	Širokolistni pleveli	Ozimna žita – v fenološki fazi od začetka razraščanja do faze drugega kolanca  Jara žita – od razvojne faze, ko so trije listi razviti do faze prvega kolanca	NP, NJ, O, R, T
<b>QUELEX</b>	<b>37,5 g 50 g</b>	Širokolistni pleveli	Ozimna žita jeseni – od razvojne faze, ko je prvi list razvit, do konca razraščanja  Spomladi ozimna in jara žita – od fenološke faze začetka razraščanja, do faze, ko je drugo kolence vsaj	NP, NJ, P, R, T

Legenda: OP – oz. pšenica, OJ – oz. ječmen, JP – j. pšenica, JJ – j. ječmen, OR – oz. rž, NO – nav. oves, SŽ – strna žita, JŽ – j. žito, OŽ – oz. žito, T – tritikala, NP – nav. pšenica, NJ – nav. ječmen, P – pira, R – rž, OT – oz. tritikala, JT – jara tritikala

			2 cm nad prvim kolencem	
<b>PALLAS 75 WG</b>	<b>120 – 250 g</b>	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od začetka razraščanja in do faze, ko je prvo kolence 1 cm nad mestom razraščanja	NP, R, T
<b>SARACEN MAX</b>	<b>25 g</b>	Širokolistni pleveli	Ozimna žita – od razvojne faze dveh razvitih listov do razvojne faze zastavičarja, ko je ploskev zgornjega lista zravnana in viden jeziček  Jara žita – od razvojne faze dveh razvitih listov do razvojne faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem	NP, NJ, NO, R, T
<b>SAVVY</b>	<b>30 g</b>	Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od faze drugega lista do pojava zastavičarja	JP, JJ, NO, NP, OJ, T
<b>SEKATOR OD</b>	<b>0,1 – 0,15 l</b>	Enoletni ozkolistni pleveli in širokolistni pleveli	Od začetka razraščanja do pojava zgornjega lista	JJ, NP, OJ, R, T
<b>SEKATOR PLUS</b>	<b>0,6 l</b>	Širokolistni pleveli	Ozimna žita – od fenološke faze začetek razraščanja, do faze, ko je drugo kolence največ 2 cm nad prvim kolencem  Jara žita – od fenološke faze, ko ima žito razvite tri liste, do faze, ko je drugo kolence največ 2 cm nad prvim kolencem	NP, NJ, R, T
<b>SHARPEN 33 EC</b>	<b>3 – 5 l</b>	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Jesen pred vznikom posevka ali takoj po vzniku posevka ali spomladji takoj po vzniku posevka	NP
<b>SHARPEN PLUS</b>	<b>2,5 – 4 l</b>	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Jesen pred vznikom posevka ali takoj po vzniku posevka ali spomladji takoj po vzniku posevka	NP
<b>STARANE FORTE</b>	<b>0,54 l</b>	Enoletni širokolistni pleveli in nekatere vrste večletnih širokolistnih plevelov	Od razvojne faze začetka razraščanja do razvojne faze, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem	OP, JP, OJ, JJ, O, R, T, P
<b>STOMP AQUA</b>	<b>2,9 l</b>	Enoletni ozkolistni in nekatere vrste širokolistni pleveli	Uporaba v razvojni fazi pred vznikom do začetka kolenčenja	NP, OJ, OR, T, JJ,
<b>TANDUS 200 EC</b>	<b>1 – 2 l</b>	Širokolistni plevel	Od faze dveh listov do začetka kolenčenja, do pozne faze nabrekanja nožnic	NP, OJ, JP, JJ, NO, T, OR
<b>TBM 75 WG</b>	<b>20 g</b>	Enoletni širokolistni pleveli	Uporaba po vzniku v fenološki fazi žit od dveh razvitih listov do faze, ko je 3. kolence 2 cm nad drugim kolencem, plevel pa je v fazi od dveh do štirih razvitih listov	NP, NJ, NO, OR, T
<b>TOLUREX 50 SC</b>	<b>2,5 – 4 l</b>	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Spomladi do začetka razraščanja žit	NP, OJ
<b>TRINITY</b>	<b>2 l</b>	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Uporaba takoj po vzniku jeseni, ko prvi list prodre skozi koleoptilo do faze, ko je tretji list razvit	OP, OJ, OR, OT

Legenda: OP – oz. pšenica, OJ – oz. ječmen, JP – j. pšenica, JJ – j. ječmen, OR – oz. rž, NO – nav. oves, SŽ – strna žita, JŽ – j. žito, OŽ – oz. žito, T – tritikala, NP – nav. pšenica, NJ – nav. ječmen, P – pira, R – rž, OT – oz. tritikala, JT - jara tritikala

<b>U 46 M – FLUID</b>	<b>11</b>	Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od faze treh listov do pojava zastavičarja	JŽ, OŽ
<b>XANADU</b>	<b>0,12 kg</b>	Enoletni širokolistni pleveli	Ozimna žita – po vzniku posevka, spomladi, od razvojne faze od začetka razraščanja do razvojne faze popolnoma razvitega zastavičarja  Jara žita – od razvojne faze, ko je tretji list razvit, do razvojne faze popolnoma razvitega zastavičarja	J, O, P, R, T

Legenda: OP – oz. pšenica, OJ – oz. ječmen, JP – j. pšenica, JJ – j. ječmen, OR – oz. rž, NO – nav. oves, SŽ – strna žita, JŽ – j. žito, OŽ – oz. žito, T – tritikala, NP – nav. pšenica, NJ – nav. ječmen, P – pira, R – rž, OT – oz. tritikala, JT - jara tritikala