

Obvestilo-pojav rumene rje na žitih 2023

Na nekaterih posevkih žit se pojavlja **rumena rja** (*Puccinia striiformis*) v precejšni meri pa se pojavlja tudi pšenična listna pegavost (*Septoria tritici*). Rumena rja se v začetni fazi pojavlja kot rahlo rumene oaze znotraj njive, če pa z roko potegnete po listu, pa vam ostane na rokah oranžni prah (spore). Za razvoj rumene rje so optimalne temperature od 10 – 15 °C in visoka zračna vlaga. Rumena rja okužuje tudi ječmen, rž, pa tudi trave, na katerih prezimi. Napad rumene rje je bolj intenziven v gostih in z dušikom dobro gnojenih posevkih ter na posevkih, kjer je minilo od 1. fungicida več kot 3 tedne, ali če sploh ni bil uporabljen fungicid, oz. je bila uporabljena takšna kombinacija, ki ima slabše delovanje na to bolezen. Rumena rja lahko zmanjša pridelek več kot 50%. V primeru, pojava okuženosti teh posevkov z omenjenima boleznima je potrebno pristopiti čimprej k zaščiti teh posevkov z ustreznim fungicidom.



Murska Sobota, 08.05.2023

Pripravil:
mag. Boštjan Ferenčak, specialist za poljedelstvo
KGZS-zavoda Murska Sobota