

Uporaba herbicidov v žitih v spomladanskem času – dovoljeni na VVO

Pri izbiri sredstev (herbicidov) je treba upoštevati navodila proizvajalcev sredstev, vremenske (temperaturne) razmere v času škropljenja ter razvoj žit in plevla. Pogoj je brezhibna naprava za nanos škropilne brozge, suha rastlina, tla rahlo vlažna, veter do 5m/s ob uporabi protiveternih šob.

Nujno je prebrati navodila za uporabo fitofarmacevtskih sredstev (ffs), upoštevati zahteve posameznih ffs glede VARNOSTNIH PASOV.

Seznam registriranih ffs: <https://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm>

Preglednica: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v Republiki Sloveniji za uporabo v žitih v spomladanskem času 2026 – herbicidi

PRIPRAVEK	ODMEREK /ha	DELOVANJE NA	ČAS UPORABE	Uporaba v
ADENTIS (tribenuron- metil 75%)	20 g	Enoletni širokolistni plevli (škrlatno rdeča mrtva kopriva, poljski mak, navadni slakovec, njivska gorjušica)	Spomladi, od razvojne faze žita, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja ter najpozneje do faze zastavičarja, ko je ploskev zgornjega lista zravnana in viden jeziček	J, P
ALISTER NEW (diflufenikan 12%+jodosulfur on 0,75%+mezosulf uron 0,9%)	1 l	Enoletni ozkolistni in širokolistni plevli	Zgodaj spomladi v razvojnem stadiju od dveh razvitih listov do konca razraščanja posevka	NP
ALLIANCE (diflufenikan 60%+metsulfuro n-metil 6%)	0,065 – 0,1 kg	Enoletni in večletni širokolistni plevli	Po vzniku posevka, od 3. lista do konca razraščanja	NP, OJ, OR, T, JJ
ALLY SX (metsulfuron- metil 20%)	30 g/ha	Širokolistni plevli	Jara žita – po vzniku posevka, v času od fenološke faze drugega lista do fenološke faze zastavičarja Ozimna žita – po vzniku posevka, v času od fenološke faze začetka razraščanja do fenološke faze zastavičarja	J, O, PIRA, P, R, T
ALTIVATE (mezosulfuron 5,83%)	0,15 kg/ha 0,25 kg/ha	Nekatere vrste enoletnega plevla (enoletna latovka, navadni srakoperec) Gluihi oves, ljuljka, njivski lisičji rep	Po vzniku posevka, od razvojne faze, ko razraščanja še ni, do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem	OP, T, R

ATLANTIS STAR (jodosulfuron 0,9%+mezosulfu ron 4,5%+tienkarba zon-metil 2,25%) + MOČILO	0,2 kg 0,333 kg	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli (navadni srakoperec, latovke, navadni plešec, kamilice, poljski mak, navadna zvezdica, jetičniki, njivska vijolica, mrtva kopriva) (njivski lisičji rep, ljuljke, stoklase, gluhi oves, plezajoča lakota)	Po vzniku posevka, od fenološke faze, ko ima žito razvito tri liste, do fenološke faze, ko je drugo kolence 2 cm nad prvim kolencem	P, T
AVOXA (pinoksaden 33,3%+piroksula m 0,833%)	1,35 – 1,8 l 1,8 l 1,35 l	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli Njivski lisičji rep, plezajoča lakota Ljuljke, kamilice, njivske vijolice	Spomladi, od fenološke faze, ko sta dve lista razgrnjena, do fenološke faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem)	OP, OR, OT
AXIAL (pinoksaden 50%)	0,6 – 0,9 l 0,9 – 1,2 l	Enoletni ozkolistni pleveli (gluhi oves, navadni srakoperec) Enoletni ozkolistni pleveli (ljuljke, njivski lisičji rep)	Spomladi, od razvojne faze treh listov do faze pojavljanja zastavičarja oz. ko je plevel v razvojni fazi 1 – 6 listov ali, ko ima razvita dva kolenca	J, P, PIRA, trda pšenica R, T – odgovornost uporabe prevzame uporabnik
AXIAL ONE (florasulam 0,5%+pinoksade n 4,5%)	1 l 1,3 l	Širokolistni pleveli, navadni srakoperec, gluhi oves Širokolistni pleveli, njivski lisičji rep, ljuljke	Po vzniku posevka spomladi, od razvojne faze, ko je razvit prvi list, do fenološke faze, ko je viden zgornji list (zastavičar), vendar je še zvít	P, J, T, R
BIZON (diflufenikan 10%+florasulam 0,375%+penoksu lam 1,5%)	1 l	Enoletni širokolistni pleveli, navadni srakoperec	Po vzniku posevka, od razvojne faze razvitega prvega lista do razvojne faze, ko so zaznavni trije stranski poganjki RŽ – od razvojne faze razvitega prvega do razvitega četrtega lista	NP, NJ, P, R, T
BONACA (fluoksipir 25%)	0,6 – 0,8 l	Enoletni širokolistni pleveli + nekatere vrste večletnih širokolistnih plevelov (srhkodlakavi ščir, plezajoča lakota, škrlatno rdeča mrtva kopriva, pasje zelišče, navadna zvezdica, slak, njivski osat, kodrastolistna kislica)	Od fenološke faze dveh razvitih listov do fenološke faze zastavičarja – ploskev zgornjega lista zravnana, viden jeziček	OP, OJ
BOUDHA (metsulfuron- metil 25%+tribenuron -metil 25%)	20 g	Širokolistni pleveli (navadni plešec, žabji krapec, škrlatno rdeča mrtva kopriva, poljski mak, navadna zvezdica, njivska vijolica)	Ozimna žita – v spomladanskem času, od razvojne faze začetka razraščanja ter najpozneje do fenološke faze, ko se začne pojavljati zastavičar Jara žita – od razvojne faze dveh razvitih listov ter najpozneje do fenološke faze, ko se začne pojavljati	J, O, P, R, T

			zastavičar	
CLYDE FX (florasulam 0,1%+fluroksipir 10%)	1,5 l	Enoletni in večletni širokolistni plevi (plezajoča lakota, navadna zvezdica, koprive, navadni plešec, kamilice)	Spomladi, od razvoje faze, ko sta dva stranska poganjka zaznavna in najdlje do pozne fenološke faze nabrekanja, ko je listna nožnica vidno nabrekla	OP, OJ
	1,5 l		Od razvojne faze, ko sta dva stranska poganjka zaznavna in najdlje do fenološke faze, ko je četrto kolence vsaj 2 cm nad drugim kolencem	JP, JJ
	1,5 l		Od razvojne faze, ko so trije stranski poganjki zaznavni in najdlje do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja	JO
	1,5 l		Od razvojne faze, ko je šest stranskih poganjkov zaznavnih in najdlje do stopnje zastavičarja -ploskev zgornjega lista zaznavna, viden jeziček	OR
	1,5 l		Od razvojne faze, ko je sedem listov razvitih in najdlje do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm na prvem kolencem	OT
	1,5 l		Spomladi, od fenološke faze konca razraščanja in najdlje do fenološke faze, ko je viden zgornji list (zastavičar), vendar je še zvít	OZIMNA TRDA PŠENICA
CORELLO DUO (florasulam 1,42%+piroksulam 7,08%) + MOČILO	265 g	Ozkolistni in širokolistni plevi (navadni srakoprec, ljuljke, samosevni oves; zmanjšuje zapleveljenosti njivski lisičji rep, stoklase, enoletne latovke) (bršljanolistni jetičnik, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, poljski mak) Krvomočnica, kamilica, njivska gorjušica, navadna zvezdica, navadna vijolica	Pi vzniku posevka, spomladi, od razvojne faze začetka razraščanja, do fenološke faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja	PIRA, OP, OR, OT
	210 g			
	170 g			
CORIDA (tribenuron-metil 75%)	20 g	Enoletni širokolistni plevi	V spomladanskem času, od razvojne faze žita, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja ter najpozneje do fenološke faze zastavičarja, ko je ploskev zgornjega lista zravnana in viden jeziček, plevi pa so v fazi intenzivne rasti – razvit šesti list	J, P
ELTIVIS (fluroksipir 25%)	0,6 – 0,8 l	Enoletni širokolistni plevi in nekatere vrste večletnega širokolistnega pleva	Po vzniku posevka od fenološke faze dveh razvitih listov do faze zastavičarja – ploskev zgornjega lista zravnana, viden jeziček (ligula)	OP, OJ
ERGON (metsulfuron-metil 6,8%+tifensulfuron-metil 68,2%)	70 g	Enoletni in večletni širokolistni plevi	Po vzniku posevka, od pojava dveh listov do pojava zastavičarja	JP, JJ, OP

ESTERON (2,4-D 2-EHE 90,5%)	0,75 l	Enoletni širokolistni pleveli	Od fenološke faze od konca razraščanja (zaznavna dva stranska poganjka) do fenološke faze drugega vidnega kolenca	J, P, T
FINY (metsulfuron-metil 20%)	30 g	Enoletni širokolistni pleveli	Od fenološke faze začetka razraščanja, ko so vidni trije stranski poganjki, do fenološke faze zastavičarja	OP, OR, OT
FLAME (tribenuron-metil 50%)	30 g	Širokolistni pleveli (navadna zvezdica do višine 15 cm, navadni repnjakovec, samosevna oljna ogrščica, poljski mak, nedišeča trirobka, njivska spominčica, njivska gorjušica – ko ima plevel razvitih 6 listov; zmanjšuje zapleveljenost s škrlatno rdečo mrtvo koprivo, navadnim plešcem	Spomladi, od fenološke faze, ko so razviti trije listi, ter najpozneje do fenološke faze zastavičarja, ko je ploskev zgornjega lista zravnana in viden jeziček in je plevel v fazi intenzivne rasti	OJ, JJ, OP
FLASH 500 SC (diflufenikan 50%)	0,28 l	Enoletni širokolistni pleveli, jetičnik, križnice, navadna zvezdica, navadni srakoperec, nedišeča trirobka, njivska vijolica, plezajoča lakota, škrlatnordeča mrtva kopriva	Uporaba po vzniku, od fenološke faze, ko je razvit prvi list, do fenološke faze, ko sta zasnovana dva stranska poganjka	NP, NJ
FLEXIDOR (izoksaben 50%)	0,25 l	Enoletni širokolistni plevel	Od razvojne faze po setvi posevka do faze razvitih treh listov	OP, OJ
FLUROSTAR 200 (fluroksipir 20%)	1 l 0,75 l	Enoletni širokolistni pleveli	Ozimna pšenica, ozimni ječmen, rž, tritikala – od razvojne faze dveh listov, do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja Jara pšenica, jari ječmen – od razvojne faze dveh listov do pojava zastavičarja	NP, NJ, O, R, T
FLUROSTAR FORTE (fluroksipir 40%)	0,5 l	Plezajoča latovka in nekatere druge vrste enoletnega širokolistnega plevela	Po vzniku posevka od razvojne faze 2 listov do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja	OZ, OJ, R, T
FLUROSTAR SUPER (florasulam 0,1%+fluroksipir 10%)	1,5 l	Plezajoča lakota in navadna zvezdica	Po vzniku posevka, od razvojne faze, ko so štirje listi razviti, do faze konca razraščanja. Najbolj primeren čas za tretiranje je po vzniku plevela, ko je le-ta v fazi intenzivne rasti	OP, OJ, R, T
FLYER (florasulam 5%)	0,15 l 0,1 l	Ozimna žita - Širokolistni pleveli (navadni plešec, plezajoča lakota, poljski mak, navadni slakovec, navadna zvezdica Jara žita - Širokolistni pleveli (navadni plešec, plezajoča lakota, poljski mak, navadni slakovec, navadna zvezdica	Po vzniku posevka, od fenološke faze treh razvitih listov do fenološke faze zastavičarja, ko je ploskev zgornjega lista zravnana in je viden jeziček	J, P, R
GRODYL	20 – 40 g	Širokolistni in ozkolistni pleveli	Od faze treh listov do drugega kolenca	NP, NJ, P, NO, R, T

(amidosulfuron 75%)				
HERBOCID XL (2,4-D 60%)	1,25 l	Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Od fenološke faze sredine razraščanja do fenološke faze konec razraščanja	J, P, R, T
HUSSAR OD (jodosulfuron 10%)	0,1 l	Ozkolistni in širokolistni pleveli	Ozimna žita - od fenološke faze začetka razraščanja do fenološke faze začetka razvoja zgornjega lista Jara žita – od fenološke faze tretjega lista do fenološke faze konec razraščanja	JJ, NP, OR, OT, OJ
HUSSAR PLUS (jodosulfuron 5%+jodosulfuron-metil natrij+mezosulfuron 0,75%)	0,2 l 0,15 l	Enoletni širokolistni in ozkolistni pleveli	Ozimna žita – od fenološke faze, ko so trije listi razviti, do fenološke faze začetka kolenčenja, ko je drugo kolence vsaj 1 cm nad prvim kolencem Jara žita – po vzniku posevka, od fenološke faze, ko so razviti trije listi, do fenološke faze začetka kolenčenja	J, P, R, T
HUSSAR STAR (jodosulfuron 3,3%+tienkarbazon-metil 2,5%) + MOČILO	0,2 – 0,3 kg 0,2 kg 0,3 kg	Enoletni širokolistni in ozkolistni pleveli Navadni srakoperec, njivska pasja kamilica, samosevna ogrščica, navadni plešec, žabji koprci, plezajoča lakota, njivska mrtva kopriva, nedišeča trirobka, njivska spominčica, navadna zvezdica, njivski mošnjak; dobro na modri glavinec, navadna rosnica, škrlatno rdeča mrtva kopriva, bršljanolistni jetičnik, njivska vijolica Gluhi oves, njivski osat, poljska ostrožnica, poljski mak, perzijski jetičnik; dobro na angleška ljuljka	Spomladi od razvojne faze začetka razraščanja žit do fenološke faze kolenčenja, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem Optimalno – ko plevel aktivno raste, širokolistni pleveli naj bodo v fazi do dveh do štirih listov, ozkolistni v razvojni fazi od vznika do sredine razraščanja	OP, OR, OT
LANCELOT SUPER (aminopiraldid 30%+flurasulam 15%)	33 g 25 g + MOČILO	Širokolistni plevel (ozimna žita - navadni plešec, njivski mošnjak, plezajoča lakota, ogrščica, navadni glavinec, nedišeča trirobka, poljski mak, škrlatno rdeča mrtva kopriva) (jara žita – navadna sončnica, navadni slakovec)	Ozimna žita – od faze začetka razraščanja do faze drugega kolena Jara žita – od razvojne faze, ko so trije listi razviti, do fenološke faze do konca razraščanja	NP, NJ, R, T
LECTOR DELTA (diflufenikan 50%+florasulam 5%)	0,1 l	Širokolistni plevel (njivska pasja kamilica, navadni plešec, navadni zebrat, plezajoča lakota, nedišeča trirobka, njivska spominčica, poljski mak, njivska gorjušica, navadna zvezdica, njivski mošnjak, bršljanolistni jetičnik, perzijski jetičnik, njivska vijolica; zadovoljivo zatira belo metliko, modri glavinec, škrlatno rdečo mrtvo koprivo)	Po vzniku posevka žit, od fenološke faze začetek razraščanja, ko je prvi stranski poganjek zaznaven, do fenološke faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem	OP, OJ, OR, OT, JP, JJ
MATENO DUO (aklonifen 50%+diflufenika)	0,35 l	Enoletni širokolistni pleveli Jara žita – navadna sončnica, navadni slakovec	Po vzniku posevka, od razvojne faze, ko je prvi list prodrl skozi koleoptilo, do faze treh razgrnjenih listov	OP, trda pšenica, P, OJ, T, R

n 10%)				
MUSTANG 306 SE (2,4-D 2-EHE+florusulam 0,625%)	0,4 – 0,6 l/ha	Širokolistni plevel	Po vzniku posevka, od fenološke faze začetka razraščanja do fenološke faze prvega kolenca, ko ima enoletni širokolistni plevel 2 – 6 listov	JP, JJ, NP, OJ
MUSTANG FORTE (2,4-D 18%+aminopiralid 1%+florasulam 0,5%)	1 l 0,8 l	Širokolistni pleveli	Ozimna žita – v fenološki fazi od začetka razraščanja do fenološke faze prvega kolenca, ko ima enoletni širokolistni plevel 2 – 6 listov Jara žita – od fenološke faze, ko so trije listi razviti, do fenološke faze prvega kolenca, ko ima enoletni širokolistni plevel 2 – 6 listov	NP, NJ, O, R, T
PALLAS 75 WG (piroksulam 7,5%)	120 – 250 g	Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel	Po vzniku posevka, od začetka razraščanja in do faze, ko je prvo kolence 1 cm nad mestom razraščanja	NP, R, T
PRIMSTAR (florasulam 0,25%+fluroksipir 10%)	1 l	Enoletni in večletni širokolistni pleveli (modri glavinec, plezajoča lakota, prava kamilica, mak, navadna zvezdica) Plezajoča lakota	Od fenološke faze začetka razraščanja, ko je stranski poganjek zaznaven, do fenološke faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja Od fenološke faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem, do fenološke faze stopnja zastavičarja – ploskev zgornjega lista zravnana, viden jeziček	J, O, P, R, T
QUELEX (florasulam 10%+halauksifenil-metil 10,42%)	50 g	Širokolistni plevel (ogrščica, plezajoča lakota, koprive, kamilice. Poljski mak, navadna zvezdica)	Ozimna žita spomladi – od razvojne faze začetnega razraščanja do fenološke faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem Jara žita – od fenološke faze začetka razraščanja, do fenološke faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem	NP, NJ, P, R, T
SAVVY (metsulfuron-metil 20%)	30 g	Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku posevka, od fenološke faze dveh razvitih listov (ječmen treh listov) in do fenološke faze preden žita dosežejo fenološko fazo zastavičarja	JP, JJ, NO, NP, OJ, T
SEKATOR OD (amidosulfuron 10%+jodosulfuron 2,5%)	0,15 l	Enoletni ozkolistni pleveli in širokolistni pleveli	Od fenološke faze razraščanja, ko je razvitih pet stranskih poganjkov, do fenološke faze kolenčenja, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvi kolencem	JJ, NP, OJ, R, T
SEKATOR PLUS (2,4-D 28,7%+amidosulfuron)	0,6 l	Širokolistni plevel	Ozimna žita – od fenološke faze začetek razraščanja, do faze, ko je drugo kolence največ 2 cm nad prvim kolencem Jara žita – od fenološke faze, ko ima žito razvite 3	NP, NJ, R, T

2,5%+jodosulfuron 0,625%)			liste, do fenološke faze, ko je drugo kolence največ 2 cm nad prvim kolencem	
SHARPEN 33 EC (pendimetalin 33%)	3 – 5 l	Enoletni ozkolistni in širokolistni plevli	Spomladi takoj po vzniku posevka	NP
SHARPEN PLUS (pendimetalin 40%)	2,5 – 4 l	Enoletni ozkolistni in širokolistni plevli	Spomladi takoj po vzniku posevka	NP
STARANE FORTE (fluroksipir 33,3%)	0,54 l	Enoletni širokolistni plevli in nekatere vrste večletnih širokolistnih plevelov	Od razvojne faze začetka razraščanja do razvojne faze, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem	OP, JP, OJ, JJ, O, R, T, P
SUNDA (fenoksaprop-P-etil 6,9%)	1,2 l	Ozkolistni plevli Ozimna žita – navadni srakoperec, gluhi oves Jara žita – navadni srakoperec, gluhi oves, navadna kostreba	Po vzniku posevka, od razvojne faze, ko je prvi list prodrl skozi kotikulo, do fenološke faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem	OP, JP, JJ, R, T
TARZEC (halauksifen-metil 6,95%+piroksulam 25%)	75 g	Enoletni ozkolistni in širokolistni plevli (njivski lisičji rep, navadni srakoperec, ljuljke, plezajoča lakota, mrtve koprive, jetičniki)	Po vzniku posevka od fenološke faze, ko sta dva lista razgrnjena, do fenološke faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem	OP, OR, OT
TBM 75 WG (tribenuron-metil 75%)	20 g	Enoletni širokolistni plevli (nedišeča trirobka, navadna zvezdica, njivska gorjušica, navadni plešec, poljski mak, ptičja dresen Delno zmanjšuje zapleveljenost – bela metlika, modri glavinec, škrlatno rdeča mrtva kopriva, prava kamilica Omejeno delovanje – pelinolistna ambrozija	Uporaba samo spomladi po vzniku posevka v fenološki fazi žit od dveh razvitih listov do faze, ko je 3. kolence 2 cm nad drugim kolencem, plevel pa je v fazi od dveh do štirih razvitih listov	NP, NJ, NO, OR, T
TIMELINE FX (fluroksipir-metil 0,175%+pinoksaden 7,5%+florasulam 3%)	1,5 l 2 l	Nekatere vrste ozkolistnega in širokolistnega plevela Njivski lisičji rep	Po vzniku posevka, od razvojne faze, ko so razviti trije listi, do faze, ko je viden zgornji list zastavičarja, vendar je še zvit	OP, JP
VALENTIA (florasulam 0,2%+fluroksipir 10%)	1,2 – 1,6 l	Enoletni širokolistni in nekateri večletni širokolistni plevli	Ozimna pšenica, ozimni ječmen, ozimna pšenica durum – po vzniku, od razvojne faze, ko so trije listi razviti, do fenološke faze, ko je listna nožnica vidno nabrekla	NP, NJ, O, R, T

	1,2 – 1,5 l 1,2 – 1,6 l		JP, JJ, JR, JT – od fenološke faze, ko so trije listi razviti, do fenološke faze zastavičarja – ploskev zgornjega lista zravnana, viden jeziček Ozimni oves – od fenološke faze, ko so trije listi razviti, do fenološke faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja	
XANADU (bensulfuron- metil 50%+metsulfuro n-metil 4%)	0,1 kg	Enoletni širokolistni pleveli	Uporaba samo spomladi Ozimna žita – od fenološke faze začetka razraščanja, do fenološke faze popolnoma razvitega zastavičarja Jara žita – od fenološke faze, ko je tretji list razvit, do fenološke faze popolnoma razvitega zastavičarja	P, J, O, R, T
ZEPPPOS (jodosulfuron 0,6%+mezosulfu ron 3%)	0,4 kg	Enoletni širokolistni in ozkolistni pleveli (navadna zvezdica, navadni srakoperec, enoletna latovka, nedišeča trirobka, perzijski jetičnik – srednje dobro deluje na njivski lisičji rep	Od fenološke faze začetka razraščanja, ko je zaznaven prvi stranski poganjek, do fenološke faze kolenčenja, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem	OP, OR, OT

Legenda: OP – oz. pšenica, OJ – oz. ječmen, JP – j. pšenica, JJ – j. ječmen, OR – oz. rž, NO – nav. oves, SŽ – strna žita, JŽ – j. žito, OŽ – oz. žito, T – tritikala, NP – nav. pšenica, NJ – nav. ječmen, P – pira, R – rž, OT – oz. tritikala, JT – jara tritikala

pripravila Metka Barbarič, KGZS-zavod MS

Vir: <https://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm>